Pflichtangaben für Werbung

1. Basistext Endverbraucher Pflichttext (außerhalb der Fachkreise)

Bisacodyl 5 mg DAH Die Apotheke hilft magensaftresistente Tabletten

Wirkstoff: Bisacodyl. Anwendungsgebiete: Zur kurzfristigen Anwendung bei Verstopfung sowie bei Erkrankungen, die einen erleichterten Stuhlgang erfordern. Für Erwachsene und Kinder ab 6 Jahren. Warnhinweise: Enthält Lactose und Gelborange-S-Aluminiumsalz.

Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihre Ärztin, Ihren Arzt oder in Ihrer Apotheke.

(Stand 12/2025)

2. Fach Pflichttext (innerhalb der Fachkreise)

Bisacodyl 5 mg DAH Die Apotheke hilft magensaftresistente Tabletten

Wirkstoff: Bisacodyl. Anwendungsgebiete: Zur kurzfristigen Anwendung bei Verstopfung sowie bei Erkrankungen, die einen erleichterten Stuhlgang erfordern. Für Erwachsene und Kinder ab 6 Jahren. Warnhinweise: Enthält Lactose und Gelborange-S-Aluminiumsalz. Zusammensetzung des Arzneimittels: Jede magensaftresistente Tablette enthält 5 mg Bisacodyl. Sonstige Bestandteile: Lactose-Monohydrat, Vorverkleisterte Stärke (Mais), Magnesiumstearat, Hypromellose, Gereinigtes Wasser, Methacrylsäure-Ethylacrylat-Copolymer (1:1) (Ph.Eur.) (Typ C; relative Molmasse: ca. 250000), Talkum, Triethylcitrat, Titandioxid, Gelborange-S-Aluminiumsalz, Chinolingelb, Hochdisperses Siliciumdioxid. Gegenanzeigen: Überempfindlichkeit gegen den Wirkstoff oder einen der sonstigen Bestandteile, Ileus, akut-entzündliche Erkrankungen des Magen-Darm-Traktes. Nebenwirkungen: Nebenwirkungen sind bei kurzfristiger Einnahme selten. Bei rektaler Anwendung von Bisacodyl kommt es selten zu Schmerzen und Blutungen des Enddarmes. Bei längerdauernder oder hochdosierter Anwendung kommt es häufig zum Verlust von Kalium und anderen Elektrolyten. Dies kann zu Störungen der Herzfunktion und zu Muskelschwäche führen, insbesondere bei gleichzeitiger Einnahme von Diuretika und Nebennierenrindensteroiden. Die Empfindlichkeit gegenüber Herzglykosiden wird verstärkt. Name und Sitz des pharmazeutischen Unternehmers: Fairmed Healthcare GmbH, Dorotheenstraße 48, 22301 Hamburg

„Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihre Ärztin, Ihren Arzt oder in Ihrer Apotheke.“

(Stand 12/2025)